

NOSAN からの新提案！！

絆 きずなみるく 乳

国産の初乳粉末をリッチに配合した **プレミアムな代用乳！！**
 特定動物性油脂(ラード)を使用し、**エネルギー効率を向上！！**
 嗜好性原料を採用し、**飲みつきやすく！！**


こんな悩みありませんか？



初生導入をしているけど
子牛の健康状態がバラバラ

子牛は下痢が出るもの。
少しでも減らしたら・・・

貧弱な子牛でも、ある程度
まで成長させたい！！



絆乳(きずなみるく)の栄養成分値


粗たん白質	24.0 %以上	カルシウム	0.3 %以上
粗脂肪	21.5 %以上	りん	0.4 %以上
粗繊維	1.0 %以下	TDN	111.0 %以上
粗灰分	10.0 %以下		

絆乳（きずなみるく）野外試験結果


<試験概要>

- 試験時期 2013年6月
- 実施場所 北海道
- 供試牛 ホルスタイン雌(1週齢)
 対照区 76頭(導入時平均体重 43.2 kg)
 試験区 21頭(導入時平均体重 43.7 kg)
- 給与期間 導入後7日間
- 給与体系
 対照区 通常の代用乳を給与
 試験区 絆乳(250g × 1.75ℓ × 2回)

1頭当たりの平均治療回数



うち、導入時体重が40kg以下の子牛の平均治療回数



5%水準で有意差あり

1頭当たりの治療回数が減少!!

給与体系

1回あたりの給与量	お湯の量	給与回数	給与期間
200~250g	1.4~1.75ℓ	1日2回	導入後7~10日間

絆乳(きずなみるく)給与時の注意点

温湯は給与時に38~40℃になるように温度を調節してください。

代用乳の溶解濃度や給与量は季節、子牛体重、糞便状態などに合わせて調節してください。

NOSAN

日本農産工業株式会社
 〒080-0010 北海道帯広市大通南13丁目5番地
 ぜんりん会館2階
 Tel:0155-26-2117 Fax:0155-26-2119
www.nosan.co.jp

