

NOSAN実験動物用飼料 成分値一覧

(2021.4)

NOSAN LABO Series			マウス・ラット用				ハムスター用	モルモット用	ウサギ用	
			ラボMRストック	ラボMRスタンダード	ラボMR-A1	ラボMRブリーダー	ラボHスタンダード	ラボGスタンダード	ラボRストック	ラボRグロワー
栄養成分	水分	%	9.2	9.0	9.7	9.9	8.1	7.5	7.3	7.4
	粗蛋白質	%	18.8	24.2	25.0	20.2	31.1	17.4	17.9	17.1
	粗脂肪	%	3.9	4.5	5.6	4.0	8.2	3.9	3.5	5.4
	粗繊維	%	6.6	4.0	4.0	3.9	3.3	18.5	16.4	17.1
	粗灰分	%	6.9	6.5	6.4	6.5	6.3	10.5	9.6	9.6
	可溶性無窒素物	%	54.7	51.9	49.3	55.6	43.1	42.4	45.3	43.5
カロリー	代謝エネルギー (ME)	kcal/100g	329.1	344.9	347.6	339.2	370.6	274.3	284.3	291.0
ミネラル	カルシウム	%	0.98	1.17	1.08	0.95	0.92	1.59	1.45	1.42
	塩素	%	0.41	0.26	0.28	0.31	0.35	0.62	0.61	0.54
	マグネシウム	%	0.26	0.17	0.17	0.27	0.19	0.20	0.29	0.24
	リン	%	0.80	0.69	0.65	0.70	0.79	0.64	0.71	0.47
	カリウム	%	0.97	0.82	0.80	0.85	0.69	1.52	1.87	1.81
	ナトリウム	%	0.29	0.22	0.21	0.20	0.26	0.37	0.36	0.28
	ヨウ素	mg/kg	0.77	1.12	0.82	0.37	0.88	1.40	1.46	1.17
	鉄	mg/kg	239.8	238.7	209.5	172.4	188.4	410.1	460.1	451.3
	コバルト	mg/kg	0.08	0.12	0.11	0.09	0.11	0.21	0.23	0.26
	マンガン	mg/kg	101.2	68.1	66.1	89	67.5	75.4	102.9	79.3
	セレン	mg/kg	0.15	0.18	0.21	0.21	0.34	0.34	0.33	0.37
	亜鉛	mg/kg	88.7	40.6	39	43.8	36.8	44.3	83.4	43
	銅	mg/kg	14.2	12.9	12.3	10.7	12.2	12.8	15.7	13.3
ビタミン	ビタミンA	IU/kg	16,150	15,653	38,311	7,146	37,679	16,088	15,903	15,646
	ビタミンD3	IU/kg	3,169	2,293	1,889	1,383	1,838	3,170	3,182	3,121
	ビタミンE	mg/kg	45.2	208.3	161.2	49	162.9	130.6	154	172.6
	ビタミンK3	mg/kg	15.4	27.4	36.2	13.8	35.2	15.4	15.5	15.2
	コリン	mg/kg	1,820	2,948	3,001	1,134	3,025	1,934	2,030	1,974
	葉酸	mg/kg	2.6	5.6	3.3	1.8	3.4	2.4	2.9	2.3
	ナイアシン	mg/kg	101.7	67.8	85.7	130.9	117.3	59.3	99.8	62.8
	パントテン酸	mg/kg	25.1	41.1	33.2	26.6	36.6	28.6	37.4	34.0
	ビオチン	mg/kg	0.3	0.8	0.4	0.4	0.4	3.1	3.6	4.2
	ビタミンB1	mg/kg	10.9	41.8	78.6	11.5	77.7	9.5	11.1	9.6
	ビタミンB2	mg/kg	8.9	19.8	17.3	7.9	17.2	13.7	15.0	15.3
	ビタミンB6	mg/kg	18.9	21.3	13.7	18.9	14.9	15.6	18.6	16.4
	ビタミンB12	mg/kg	0.026	0.030	0.031	0.074	0.037	0.023	0.022	0.018
	ビタミンC	mg/kg	49.1	1,562.6	0.8	49.0	0.8	1,621.8	49.3	48.3
	イノシトール	mg/kg	9.7	741.2	94.4	46.6	91.8	9.7	9.7	9.5
	カロチン	mg/kg	1.2	1.8	1.9	3.6	8.7	80.3	94.7	111.1
アミノ酸	アルギニン	%	1.09	1.27	1.34	1.05	1.46	0.90	1.00	0.87
	ヒスチジン	%	0.46	0.54	0.57	0.50	0.65	0.36	0.40	0.35
	イソロイシン	%	0.67	0.89	0.95	0.73	1.11	0.62	0.65	0.61
	ロイシン	%	1.36	1.81	1.90	1.81	2.81	1.23	1.31	1.31
	リジン	%	0.89	1.09	1.17	0.86	1.29	0.81	0.78	0.70
	メチオニン	%	0.26	0.35	0.54	0.34	0.68	0.21	0.19	0.37
	フェニルアラニン	%	0.84	1.17	1.22	0.99	1.52	0.77	0.81	0.78
	スレオニン	%	0.64	0.80	0.85	0.68	1.02	0.65	0.69	0.66
	トリプトファン	%	0.21	0.23	0.23	0.17	0.24	0.21	0.24	0.21
	バリン	%	0.79	1.00	1.05	0.87	1.27	0.78	0.82	0.79
	シスチン	%	0.28	0.35	0.36	0.31	0.42	0.25	0.29	0.28

※ 数値は配合率から算出した計算値です。実際の数値は飼料の保管状況、製造後の経過時間等によって多少変化します。

※ 代謝エネルギー値は、Atwater係数 (粗蛋白: 4kcal/g、可溶性無窒素物: 4kcal/g、粗脂肪: 9kcal/g) に基づいて算出した計算値です。