


A飼料

NOSAN ほ乳期子豚育成用配合飼料

2018年
リニューアル!

ウイニーロブリン

分娩子豚の免疫と活力をサポート ～初乳代替のミルクリプレーサー～ 3日齢までの子豚の発育をサポート



- ・免疫グロブリンを含む牛初乳粉末を配合
- ・“低血糖～低体温～低栄養”の負のスパイラルを断ち切る!

2018
New!

γ. 豊富な糖分が活力の源

- 強化した**ぶどう糖**、**果糖**が速やかに子豚の活力に。
- 腸管の栄養となる**グルタミン酸**を配合。

γ. 免疫と腸から赤ちゃん健やか

- 良質な牛の**初乳粉末**、**鶏卵抗体**、**活性型酵母**、**代謝型ビタミンD3**のはたらきで免疫力を保ちます。
- **生菌剤**と**オリゴ糖**の相乗効果でお腹の調子を整えます。
- **有機酸**のはたらきで消化をサポートします。

γ. ごくごく飲んで子豚すくすく

- **ミルク&ベリーフレーバー**で子豚がとびつく香りです。
- 植物由来の**天然甘味料**を加え、子豚にやさしい甘さです。

γ. さらさら溶けて作業もラクラク

- お湯に溶けやすい原料を使用しています。

製品名	粗蛋白質 (%以上)	粗脂肪 (%以上)	粗繊維 (%以下)	粗灰分 (%以下)	TDN (%以上)	カルシウム (%以上)	りん (%以上)
ウイニーロブリン	28.0	2.0	1.0	7.5	112.0	0.70	0.60

NOSAN 日本農産工業株式会社


〒220-8146 横浜市西区みなとみらい2-2-1
ランドマークタワー46階
TEL 045-224-3704
<http://www.nosan.co.jp>

「ウイニーロブリン」の基本的な使い方


- 分娩初日～最大で3日齢まで、1頭あたり2gを8ccのお湯(ミルクの4倍量)に溶かし、1日3回(朝、昼、夕)給与します(合計:9回給与)。(12頭分娩の母豚に対して“ウイニーロブリン:24g+お湯96g”という設定です)。
- 溶解したミルクをシリンジなどで吸い上げ、1頭あたり約10ccを子豚の口の中に流しこんで下さい。

- ☆生まれたての子豚は初乳から栄養と免疫を獲得します。
- ☆子豚が免疫グロブリンを腸から吸収出来るのは生後36時間程度まで。その間に初乳を飲ませる必要があります。

子豚はしっかり初乳を飲めていますか？



～子豚を健やかに育てる“NOSAN”子豚代用乳～



製品名	用途、給与期間の目安	特徴
ウイニーガンマくん	初乳の代用乳。分娩日に1回給与。	免疫グロブリンを含む牛初乳粉末を豊富に配合した1ショット初乳代用乳。
マザーミルクネオ		ウイニーガンマくんの大容量版(250g/袋)。
ウイニーロブリン	初乳の代用乳。分娩日～3日齢に給与。	初乳を飲んでいない子豚のための代用乳。3日齢以降も下痢が続く場合は+1～2日給与。
ウイニーミルク	常乳の代用乳。3～14日齢に給与。	母乳を飲んでいない子豚のための代用乳。
ウイニースタート	常乳の代用乳。14日齢～離乳まで給与。	母豚の乳量が不十分な時や、虚弱豚のサポートに使用。